











Quelles variétés d'abricots pour demain, en région AURA

Chamet Christophe / SEFRA
Déc 2022

Evolution des conditions hivernales et de la phénologie



Evolution des conditions hivernales et de la phénologie



Donc des variétés à besoin en froid moyen
(à élevé) et fleurissant tard...

...en plus du reste

Quelles variétés sur le
créneau de juillet août
en AURA?





NOOGAT Cov

éditeur : CEP Innovations

- Maturité époque
Bergeron -2/3j



- Arbre présentant des
dégarnissements /
Taille en vert
impérative



- Floraison tardive
- Bon potentiel
- Bonne qualité
gustative
- Epiderme rustique





KALAO Cov
éditeur : PSB



- Floraison Moy à tardive
- Bon comportement au gel sur petits fruits
- Besoin en taille modéré/facile à conduire
- Bon potentiel
- Bonne qualité gustative
- Bonne tenue du fruit
- Epiderme rustique

- Maturité époque
Bergeron -2/3j



- Assez sensible bactériose
- Eclaircissage parfois important
- Point pistillaire à surveiller sur gros calibre





- Floraison tardive
- Bon potentiel de charge
- Présentation du fruit (rond, coloré)
- Epiderme rustique aux manipulations
- Bonne qualité (doux, sucré)

ARISTO Cov
éditeur : PSB

- Maturité époque
Bergeron



- A réserver aux zones
Nord



- Besoin en froid
hivernal
- Eclaircissage soigné
- Point pistillaire à
surveiller sur gros
calibre





- Floraison tardive
- Résistant Sharka
- Excellente qualité gustative
- Très belle présentation



ARAMIS® ORIGAT Cov

éditeur : CEP Innovations

- Maturité époque
Bergeron + 10j



- Variété en début
d'expérimentation : potentiel
et rusticité du fruit à
confirmer



- Sensible bactériose





NELSON cov
éditeur : PSB



- Potentiel de charge/calibre
- Régularité de production
- Bonne qualité gustative
- Bonne coloration
- Epiderme rustique aux manipulations

- Maturité époque Bergeron + 15j



- Conduite de l'arbre les 1ères années (ouvert et souple)
- Sensibilité du fruit au cracking à revoir

- Floraison d'époque moyenne, souvent importante





- Floraison très tardive
- Vigueur de l'arbre
- Potentiel de charge
- Bonne qualité gustative
- Epiderme rustique à la pluie et aux manipulations



WINTER COT cov

éditeur : COT International

- Maturité époque
Bergeron + 15j



- Variété en début d'expérimentation : régularité à confirmer. Sans doute une excellente variété pour les zones d'altitude



- Besoin en froid hivernal élevé
- Coloration du fruit
- Calibre à revoir
- Peu de bouquets de mai



RUBYNGO® 3-13-269 cov

éditeur : I.P.S.



- Floraison tardive
- Vigueur de l'arbre
- Facilité de conduite
- Potentiel de charge/calibre
- Présentation du fruit
- Tenue du fruit
- Résistant Sharka



- Maturité époque
Bergeron + 20/25j



- Déclenchement de la cueillette
- Fruit très doux





- Epoque de maturité
- Présentation du fruit
- Tenue du fruit



WINNIE COT cov éditeur : COT International

- Maturité époque
Bergeron + 20/25j



- Variété en début
d'expérimentation, à suivre
sur un créneau de maturité
intéressant



- Expérimentation en
cours





- Epoque de maturité
- Présentation du fruit
- Tenue du fruit
- Qualité du fruit
- Epiderme rustique
- Bon comportement à la pluie



MADRIGAL cov éditeur : PSB

- Maturité époque
Bergeron + 30/35j



- Floraison d'époque moyenne
 - Variété intéressante sur le créneau Farbaly



- Coloration acquise tôt / ne pas anticiper la cueillette
- Arbre avec dégarnissements





CARMINGO® FARDOSA cov

éditeur : I.P.S.



- Epoque de maturité
- Qualité du fruit
- Tenue du fruit
- Potentiel de calibre
- Epiderme rustique aux manipulations

- Maturité époque
Bergeron + 35/40j



- Présentation du fruit
- Quelques défauts d'épiderme
- Vigueur moyenne



- Epoque de floraison
moyenne
- Apporte de la jutosité sur le
créneau tardif





COCKLI'COT cov

éditeur : Cot International



- Epoque de maturité
- Arbre facile
- Potentiel de calibre
- Tenue du fruit
- Qualité du fruit
- Bon comportement à la pluie



- Expérimentation en cours



- Variété en début d'expérimentation
- Maturité après Farlis
- Floraison d'époque moyenne

Variétés préconisées ou prometteuses sur le créneau de saison et tardif en région AURA

